



## لیست داروهای پرخطر

۱	دوز اول آنتی بیوتیکها	۱۲	هپارین
۲	ویالهای چند دوزی	۱۳	وارفارین
۳	انسولین (Novoropid, Novomix, Regular, Nph)	۱۴	داروهای شیمی درمانی
۴	نارکوتیک (Fentanyl, Methadon, pethedine, Morphine)	۱۵	کلیه داروهای بیهوشی مورد استفاده در اتاق عمل
۵	دیگوکسین	۱۶	فنتانیل
۶	KCL	۱۷	تیوپنتال
۷	منیزیم سولفات	۱۸	پروپوفول
۸	TPN (اینترالیپید، آمینوژن، گلوکز ۲۰ و ۵۰٪)	۱۹	داروهای بخش رادیوتراپی
۹	خون و فرآورده های خونی	۲۰	داروهای شیمی درمانی
۱۰	دوپامین		
۱۱	دوبوتامین		

- دادن داروهای پر خطر بر اساس خط مشی «دارو دهی صحیح طبق استاندارد های RIGHT» انجام می گیرد. (تمامی اشکال داروهای پر خطر بایستی دبل چک شوند).
- تمام مراحل دارودهی پر خطر (ثبت order توسط پزشک تا انتهای دارو دهی) توسط دو پرستار Double check می شود.
- Right client/Right drug/ Right dose/ Right route/ Right time/ Right documentation
- بیمار صحیح، داروی صحیح، دوز صحیح، روش صحیح، زمان صحیح، ثبت صحیح.